Observation sur une hydropisie
de l'ovaire par le sieur Geme Elève en chirurgie qui
luy a été communiquée par mr. Mougenot son beau pere
lieutenant de mr. le premier chirurgien du Roy, stipendié
pour les accouchemens &c. à Mircourt en Lorraine

L'ordre que nous nous proposons de suivre en redonnant cette observation est de faire 1° le détail de la maladie. 2° de circonstancier les remarques qui ont été faites dès l'ouverture du cadavre. 3° celles que nous avons crû devoir faire sur la piéce actuelle. et si l'académie nous le permet, nous ferons mention des principales observations que nous avons extraites des auteurs qui ont tombés sous nos mains.

Melle *** à l'âge de 38 ans eut une inflammation du bas-ventre qui fut traitée méthodiquement par un medecin. quelque tems après cette maladie, elle sentit à la région illiaque droite une tumeur qui ne luy faisoit aucun mal. comme elle craignoit quelques mauvaises suittes, elle consulta son medecin qui ayant regardé cette tumeur comme scirreuse luy ordonna l'usage des fondans tant intérieurement qu'extérieurement. cette demoiselle lassée du peu de succes des remedes, abandonna sa maladie à la nature qui ne fit pas beaucoup de progrès pendant près de dix ans. mais l'accroissement augmenta ensuitte de telle sorte que cette delle n'osoit plus se montrer dans les ruës. car quoiqu'elle fut dans le marasme, elle marchoit et montoit sans aucune difficulté de respirer, ses dégrés avec autant de vitesse et de liberté qu'une personne de quarante ans en bonne santé. il est bon aussi de remarquer que cette delle a toujours mangée amplement dans sa maladie et a digerée facilement à l'exeption que vers les deux derniers mois les digestions étoient laborieuses et le marcher difficile; ce qui dependoit d'une oedematie qui etoit survenüe aux jambes accompagnée de phlictenes qui ont coulées quelques tems. elle ne pouvoit se coucher que de côté, elle preféroit le droit. la tumeur en effet y panchoit plus que du côté gauche. cette delle est morte subitement le trois janvier à 7 heures du matin, dans la 53e. année de son âge après avoir pris à dejeuné une écuelle de caffé au lait comme à son ordinaire. elle n'a jamais voulu se laisser faire aucun remede, car les intentions

ARC 39
n° 75

De mon beau Pere dans l'état ou il l'avoit vû quelques tems avant sa mort étoient de luy faire la ponction.

il fit ~~le jour [illegible]~~ l'ouverture de son cadavre. après qu'il eut ouvert les parties contenantes qui étoient extrémement amaincies, il trouva que la surface de ce Kiste étoit très polie et d'une blancheur de lait, il debordoit de près d'un pied les os pubis, et le lieu des cuisses ou il posoit étoit échimosé. il mésura ce Kiste, il trouva que depuis le cartilage Xiphoïde jusqu'au pubis il avoit deux pieds huit pouces et trois pieds et demi de circonférence. il proceda ensuitte à l'extraction du contenu par un coup de trois quart, d'où il sortit une liqueur brune assez coulante, sans odeur. pour considérer l'intérieur de ce Kiste et accélerer ses recherches, il fit une grande ouverture, d'où il s'évalua la quantité d'environ quarantes pintes d'une liqueur dont la consistence étoit louche et assez coulante d'abord, mais si épaise ensuitte qu'il fut obligé de l'extraire avec la main. après qu'il eut séparé les adhérences que ce Kiste avoit par son fond avec l'estomac dont la capacité étoit extrémement petite, un peu au diaphragme, au foye au dessus du lobe de Spigelius, à l'appendice coecale et à quelques endroits du mesentere; comme on peut le remarquer à la piéce, il le retourna et reconnut à son fond plusieures hydatides de grosseurs différentes, depuis celle d'un pois, jusqu'à celle d'un gros oeuf, ou l'on voyoit à travers de leurs menbranes minces et transparentes un liquide de diverses couleurs dont sa consistence approchoit du meliceris. plusieures de ces hydatides se séparoient aisément avec la main.

L'épaisseur de ce Kiste varie beaucoup. dans certains endroits il n'a gueres plus d'une ligne, dans d'autres il en a quatre à cinq. ce sac est composé de trois menbranes. l'extérieure est un prolongement du ligament large. la 2e. paroît être la distention de l'ovaire. la 3e. n'est autre chose qu'un feuillet de la 2e. ces menbranes sont unies par un tissu cellulaire plus ou moins lâche.

à l'égard des hydatides: leurs menbranes sont au nombre de deux: la plus extérieure n'est autre chose qu'un prolongement de la menbrane interne du Kiste. cela ne doit point paroître équivoque, vû que son fond est composé de beaucoup de feuillets qui servoient non seulement à soutenir les hydatides, mais encore à les recouvrir. pour ce qui regarde ces hydatides. si nous ne craignons d'exposer notre sentiment, nous dirions que nous les regardons comme chacunes des vesicules de l'ovaire qui se sont accruës par l'accumulation du même liquide qui étoit contenu dans le grand

Kiste, que la menbrane extérieure est, comme nous l'avons déja exposés, le prolongement de la troisiéme menbrane du Kiste principal, et que la deuxiéme est la menbrane propre de la vesicule.

au Sujet de la matrice nous dirons que quoique sa figure extérieure soit naturelle, l'intérieure n'est pas de même: Surtout au côté droit ou l'on remarque que sa parois est entiérement obliterée. la trompe du même côté qui s'est prêtée à l'extension du Kiste a acquis la longeur d'un pied, son canal du côté frangé n'a guéres plus de diametre que dans l'état naturel, mais à mesure qu'il s'approche de l'uterus il se retrecit de façon à ne pouvoir permettre le passage de l'air.

Les hydropisies de l'ovaire qui sont communes parviennent rarement au degrés qui fait le Sujet de notre observation. cependant il en est qui l'égale et qui la Surpasse. mr Morand dans ses remarques sur les hydropisies de l'ovaire (a) rapporte une observation de mr. Duret qu'il a communiqué à l'académie dont le Kiste contenoit 50 pintes d'eau. j'ay vû un Kiste que l'academie a mis en dépot chez mr. Leuret qui contenoit 50...... de liqueur. mr. de la Porte (b) qui a attaqué une hydropisie de l'ovaire par incision a fournit à differentes reprises 67 livres d'une humeur mucilagineuse. mr montaulieu le fils dit avoir repeté la ponction 19 fois en 9 mois de tems à une femme âgée de 45 ans, il tira réguliérement chaque fois dix huit à vingt pintes de liqueur. (c) on lit dans les transactions philosophiques d'Edinbourg (d) qu'on fit à une femme âgée de 29 ans la ponction 57 fois en quatre ans de tems, qu'à chaque fois on luy tiroit 18, à 20. pintes. on a évalué la quantité du liquide qu'on luy a tiré à mille pintes. des observations qui sont inserées dans les éphemerides d'almagne sur les hydropisies de l'ovaire, celle qui frappe le plus contenoit 30 pintes d'une sérosité jaunâtre (e)

Nous aurions pû faire mention de diverses autres observations sur les hydropisies de l'ovaire, les ouvrages périodiques en sont remplis. Si nous présentons cette observation à l'académie; c'est que nous sçavons, et même par elle (f) qu'un grand nombre d'observation sur un même Sujet ne nuit pas. vû qu'il est presque

(a) remarques sur les hydropisies de l'ovaire pag. 455 du 2e volume.
(b) recueilles de plusieurs memoires et observations d'hydropisies enkistées du bas ventre pag. 453.
(c) idem. pag. 448.
(d) année 1732. pag. 423.
(e) dec. 2, an. 9, observ. 136. pag. 234.
(f) histoire de l'académie Royale de chirurg. pag. v. du 2e volum.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

impossible que toutes les circonstances soient les mêmes, et qu'ausurplus, il n'y a point de fait, en matiere d'art, fut-il aussi ancien que le — monde dont on ne puisse faire tous les jours un nouvel usage pour l'amélioration de l'art et pour le bien de la Societé.

Geme